

※範圍：第一單元第3章；第三單元第1~3章。

※答題說明：本測驗卷為「單一選擇題」，請選出一個最合適的答案。每題 2 分，共 100 分。

1. ( ) 非淋菌性尿道炎是台灣感染率最高的性傳染病。  
(A)正確 (B)錯誤。

2. ( ) **圖一**是網路上流傳的圖片，請判斷其正確性。  
(A)正確，男生感染淋病排尿會有刺痛及灼熱感，女性患者症狀不明顯 (B)錯誤，不論男生女生都有尿道，所以感染的痛苦程度無差別 (C)錯誤，女性感染者除排尿灼熱感外，外陰部位還會出現水泡及潰瘍，疼痛更甚於男性。

**圖一**



3. ( ) 有關性傳染病及其俗稱的配對，何者正確？(A)淋病-黏濁 (B)梅毒-菜花 (C)生殖器疱疹-正痘 (D)軟性下疳-長芒果。

4. ( ) 在產房，醫師常規會給予新生兒眼藥膏，此舉能有效降低新生兒因為經過產道感染病原體，而造成眼部視神經炎的機率。(A)正確 (B)錯誤。

5. ( ) **表一**為2024年7月某新聞報導中所引用的資料，何者較適合作為該文章的標題？(A)性病感染人數飆升，國人應盡速接種疫苗 (B)我國淋病與梅毒感染人數逐年增加中，有助提升群體免疫 (C)去年青少年染性病飆升，創6年最高紀錄 (D)衛教宣導有成，青少年能保護自己，遠離性病感染風險。

**表一**

年度	淋病		梅毒	
	13-18歲	全體	13-18歲	全體
2018	191	4167	81	7777
2019	223	4469	91	7301
2020	411	7024	88	6989
2021	488	7331	88	7656
2022	512	7958	170	8014
2023	667	8204	262	8277

資料來源：衛福部疾管署 製表：記者林惠琴

6. ( ) 何者不是女性感染淋病延誤就醫可能引起的後果？(A)子宮內膜炎 (B)輸卵管炎 (C)不孕症 (D)精神病。

7. ( ) 非淋菌性尿道炎最常見是經由杜克萊氏嗜血桿菌

所引起。(A)正確 (B)錯誤。

8. ( ) **圖二**為「M痘」疫苗宣導單張，此病在過去被稱為「猴痘」。(A)正確 (B)錯誤。

**圖二**



9. ( ) 承上題，現在接種M痘疫苗者可免費獲得愛滋自我篩檢試劑乙份，原因是愛滋感染者不會同時感染M痘，若愛滋檢測為陽性，就沒必要接種M痘疫苗了。(A)正確 (B)錯誤。

10. ( ) 除了經由親密接觸之性行為傳染外，M痘還可以透過人畜共通傳播與飛沫傳染。(A)正確 (B)錯誤。


11. ( ) **表二**為衛生福利部公告的112年死因統計結果摘要表其中的一小部分。下列敘述何者正確？(A)「事故傷害」已取代「惡性腫瘤」，成為國人第一大死亡原因 (B)依據死亡原因排序看來，這張表格統計的族群應該不是全體國人，而較可能是1-14歲的兒童青少年 (C)「自殺」也是事故傷害的一種 (D)傳染病是現代人最大的死亡威脅。

**表二**

順位	死亡原因	死亡人數	死亡率	死亡人數結構比%
	所有死亡原因	374	14.0	100.0
1	事故傷害	73	2.7	19.5
2	惡性腫瘤	69	2.6	18.4
3	蓄意自我傷害	24	0.9	6.4
4	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	20	0.7	5.3
5	先天性畸形、變形與染色體異常	20	0.7	5.3
6	加害（他殺）	14	*	3.7
7	流行性感冒	8	*	2.1
8	肺炎	8	*	2.1
9	敗血症	5	*	1.3
10	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	5	*	1.3
	其他	128	4.8	34.2

12. ( ) 有關性病的敘述，何者正確？(A)傳染對象僅限於成年人 (B)只要曾感染過一種性病，就會對所有性病產生抵抗力 (C)性病只會感染生殖器官，不會殃及身體的其他部位 (D)多重性伴侶者感染性病的機會大增。

13. ( ) **圖三**是台灣癌症基金會所製作的宣導品，其中所指可能引發6癌1病的病原體「H??」為何？  
(A)HBV (B)HCV (C)HIV (D)HPV。



14. ( ) 承上題，該病毒可能誘發的疾病「★」為何？  
(A)生殖器疱疹 (B)軟性下疳 (C)尖形濕疣 (D)淋病。

15. ( ) 「安全性行為」是指沒有體液交換的性行為。  
(A)正確 (B)錯誤。

16. ( ) **圖四**中，哪些是愛滋病的傳染途徑？(A)甲乙丁戊 (B)乙丙丁 (C)甲戊己 (D)丙丁。



17. ( ) 何者不是青少年預防性病所應遵守的三原則？  
(A)Abstinence 節制 (B)Be faithful 忠誠  
(C)Condom 保險套 (D)Determination 決心。

18. ( ) 生殖器疱疹又稱疱疹一型，沒有可以根治的藥物，很容易復發。(A)正確 (B)錯誤。

19. ( ) 保險套使用步驟的正確排序為何？(A)取套丟捏撕 (B)套取撕丟捏 (C)捏丟取撕套 (D)撕捏套取丟。

20. ( ) 為響應環保，保險套可以清潔後重複使用。(A)正確 (B)錯誤。

21. ( ) 愛滋病的全名為何？(A)後天免疫缺乏症候群 (B)免疫系統功能失調 (C)自體免疫疾病 (D)全身性紅斑狼瘡。

22. ( ) 母乳含有多種抗體，可以增強人體抵抗力，所以愛滋媽媽更應該親自哺餵母乳。(A)正確 (B)錯誤。


23. ( ) 子宮頸疫苗是用以對抗癌細胞的「治療性」疫苗，是適用於子宮頸癌患者的免疫治療方法。(A)正確 (B)錯誤。

24. ( ) 「友善性病門診」會安排與就診民眾同性別的醫師協助進行疑似性病症狀的診療，以化解尷尬。(A)正確 (B)錯誤。

25. ( ) 所有事故都是意外引起的，所以「事故傷害」也可稱為「意外事故」。(A)正確 (B)錯誤。

26. ( ) 裝設冷暖氣合一的空調取代除濕機和電暖器，使用上會較安全。(A)正確 (B)錯誤。

27. ( ) **圖五**標示出該車輛駕駛人看不見的範圍，稱為「視野死角」。(A)正確 (B)錯誤。



28. ( ) 為達到有效換氣，熱水器不論裝在室內室外都應該加裝通風管。(A)正確 (B)錯誤。

29. ( ) 高樓環境中，戶內空氣沿著有垂直坡度的空間向上或下降，造成空氣加強對流的現象，稱為「煙囪效應」。(A)正確 (B)錯誤。

30. ( ) 承上題，建築物內的哪一構造與煙囪效應較無關？(A)防盜鐵窗 (B)樓梯間 (C)電梯間 (D)管道間。

31. ( ) 使用滅火器時，應朝火源上方左右移動掃射，才能有效滅火。(A)正確 (B)錯誤。

32. ( ) 緩降機是可讓人員以垂降方式逃生的消防設備。(A)正確 (B)錯誤。

33. ( ) 依據各類場所消防安全設備設置標準，兩層樓以上的建築物，必須在每一個樓層都設置緩降機。(A)正確 (B)錯誤。

34. ( ) 緩降機使用方式口訣的正確排序為何？(A)丟束  
推套掛 (B)束套掛推丟 (C)掛丟套束推 (D)推掛  
丟套束。
35. ( ) 當住家發生火災時，何者為正確的處理方式？  
(A)用塑膠袋套頭，避免吸入濃煙 (B)若發現忘  
記攜帶財物逃生，應盡快返回火場搶救 (C)身處  
高樓層者應搭乘電梯，加快逃生速度 (D)低姿勢  
爬行，沿牆面逃生。
36. ( ) 經歷921大地震之後，中央政府訂立每年9月21日  
為「世界防災日」。(A)正確 (B)錯誤。
37. ( ) 發生地震時，因地面重複的劇烈搖晃，造成土質  
疏鬆且含水飽和的狀態稱為「土壤液化」。(A)  
正確 (B)錯誤。
38. ( ) 台灣位於歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊交界處，  
屬於世界上有感地震最頻繁的地區之一。(A)正  
確 (B)錯誤。
39. ( ) 緊急避難包內物品至少應該多久檢查更新一次？  
(A)1個月 (B)3個月 (C)6個月 (D)12個月。
40. ( ) 車輛進行轉彎時，前後輪為不同路徑，兩輪的行  
駛軌跡差距稱為「內輪差」，行人在路口停等時  
應避免進入此範圍。(A)正確 (B)錯誤。
41. ( ) 搭乘轎車時，未滿幾歲不可坐在副駕駛座？  
(A)2 (B)6 (C)12 (D)15。

**■請閱讀以下短文，並回答第42~46題。**

梅毒是個古老的疾病，從15世紀開始就在歐洲肆虐，有位義大利醫師暨詩人用拉丁文寫下一首詩，內容描述一位名叫西佛勒斯 (*Syphilis*) 的牧羊人，負責照護國王的牲畜。當遭逢大旱，牲畜活不下去之際，牧羊人西佛勒斯就咒罵天神，因而換來天神的懲罰，降下病原感染大地。牧羊人西佛勒斯首當其衝，罹患了一種讓人四肢消瘦、發出惡臭，既痛苦又骯髒的疾病，這種病因而被稱為 '*Syphilis*'，中文稱之為「梅毒」。

在當時，人們注意到梅毒的侵襲力超強，一點一滴吃掉人們的外生殖器，再吃掉人們的臉，讓尋歡作樂的人各個變得面目可憎，更引發全身疼痛，讓人痛到下不了床，還找不到醫師診治，受盡折磨幾個月後死亡。因此，梅毒在文藝復興時期成為歐洲的頭號殺手，在莎士比亞筆下被形容為「無窮無盡的腐爛」，在愛滋病出現前可說是性病界的「第一殺手」，諸多政壇、文藝名人似乎都難以逃脫其毒手。

(摘錄自照護線上，白映俞醫師，20181006)

42. ( ) 現今醫學發達，我們已知梅毒不是天神的懲罰，而是梅毒雙球菌的感染。(A)正確 (B)錯誤。

43. ( ) 第一期梅毒，患者的生殖器官附近會出現硬硬紅紅的小潰瘍，稱為「硬性下疳」。(A)正確 (B)  
錯誤。
44. ( ) 第一期梅毒的傷口雖然會自行痊癒，但不代表疾  
病已經根除，可能還會演變為第二期與第三期梅  
毒。(A)正確 (B)錯誤。
45. ( ) 第三期梅毒常出現不痛不癢的皮膚疹與淋巴結腫  
脹，稱之為「梅毒腫」。(A)正確 (B)錯誤。
46. ( ) 梅毒不會經由母子垂直感染的方式傳染。(A)正  
確 (B)錯誤。

**■請閱讀以下短文，並回答第47~50題。**

響應西洋情人節，疾病管制署推出愛滋自我篩檢試劑期間限定推廣活動，自2月14日起至2月28日止，民眾於疾管署「自我篩檢計畫官網」，以「網路訂購超商取貨」通路，購買愛滋自我篩檢試劑，享「買雙付一且免運費」優惠，亦即支付1組自我篩檢試劑費用，可同時獲得血液及唾液自我篩檢2組試劑且免運費，鼓勵民眾與伴侶一同篩檢，了解自身健康狀態，讓自己及伴侶朋友都安心。

疾管署統計2024年共提供超過8.4萬人次自我篩檢服務，創歷年新高。而2024年新增確診通報本國籍愛滋病毒感染人數為1,002人，且85%為45歲以下的青壯年族群，主要感染原因9成以上為不安全性行為。因此，只要曾有性行為者，都建議至少進行1次愛滋篩檢，有不安全性行為者，建議每年至少進行1次篩檢，若有感染風險行為（如感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等）、或性伴侶有前述任一情形者，建議每3至6個月篩檢1次。

不過自我篩檢試劑屬愛滋抗體篩檢試劑，於感染愛滋病毒後23-90天（約4-12週）才能檢測出是否感染。所以，除愛滋自我篩檢計畫外，疾管署亦設置匿名篩檢服務點，由專業人員使用最新「愛滋抗原/抗體複合型快速篩檢試劑」提供民眾篩檢，有效縮短至病毒感染後2~3週即能檢驗出是否感染。

(摘錄自衛生福利部疾病管制署網站，20250213)

47. ( ) 愛滋自我篩檢試劑分為血液型及唾液型兩種。  
(A)正確 (B)錯誤。
48. ( ) 針對注射海洛因成癮且與人共用針具者，建議多  
久進行一次愛滋篩檢？(A)一生一次 (B)一年一  
次 (C)每3~6個月一次 (D)每4~12週一次。
49. ( ) 自感染愛滋病毒後，到可以被愛滋抗體篩檢試劑  
檢驗出感染的時間稱為「空窗期」。(A)正確  
(B)錯誤。
50. ( ) 愛滋「空窗期」時，感染者不具有傳染力。(A)  
正確 (B)錯誤。